

核准日期:2007年11月05日
修订日期:2012年04月27日
2013年05月08日
2013年09月07日
2015年12月01日
2016年07月18日
2018年04月10日
2020年05月08日
2021年09月08日



A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称:A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗
商 品 名:盟纳康(Mening A Con)
英文名称:Meningococcal Group A and C Conjugate Vaccine
汉语拼音:A.Qun.C.Qun.Nao-mo-nan-qiu-jiao.Duo-tang-jie-he-ming-ao

【成分和性状】

本品系选用A群、C群脑膜炎奈瑟氏菌培养液,提纯获得荚膜多糖抗原,将其与破伤风类毒素结合,再经纯化、加铝、氯化铝在剂吸附后制成。为乳白色混悬液,不应有摇不散的块状物。

有效成分:A群和C群脑膜炎球菌荚膜多糖。

辅 料:氢氧化铝、氯化钠。

【接种对象】

3月龄以上婴幼儿及成人。

【作用与用途】

接种本品能产生特异性体液免疫应答,用于预防A群、C群脑膜炎球菌引起的感染性疾病,如脑膜炎、败血症、化脓性关节炎、皮肤脓肿等。

【规格】

每支0.5ml(预灌装注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖10μg。

【免疫程序和剂量】

- (1) 用前充分摇匀。
- (2) 12月龄至3岁儿童肌肉注射,每1次人用剂量0.5ml。
- (3) 免疫程序:
2~3岁儿童(基础免疫)接种2次,间隔1个月注射一次;
1~2岁儿童基础免疫注射2次,间隔1个月注射一次;
3岁以上儿童或成人基础免疫注射1次。

【不良反应】

常见不良反应:

- (1) 接种后24小时内,注射部位可出现疼痛和酸痛,注射局部红肿、硬结、压痛,偶有局部瘙痒感。多数情况下2~3天内可自行缓解,必要时可对症治疗。
- (2) 一般在接种疫苗后可能出现一过性发热反应。其中大多数为轻度发热反应,一般持续1~2天,可自行缓解,必要时可对症治疗。
- (3) 偶有烦躁、嗜睡、呕吐、腹泻、食欲不振。

罕见不良反应:

- (1) 严重过敏反应,应给予对症处理,以防高敏反应。
- (2) 注射局部重度红肿或其他并发症,应对症处理。

极罕见不良反应:

- (1) 过敏性休克:一般在注射疫苗后1小时内可能发生,应及时抢救,注射肾上腺素进行治疗。
- (2) 过敏性紫癜:出现过敏性紫癜反应时应及时就诊,应用皮质固醇类药物给予治疗,可能并发紫癜性肾炎。

【禁 忌】

- (1) 患急性疾病、严重慢性疾病,慢性疾病的急性发作期和发热者。
- (2) 已知对该疫苗的任何成分过敏者,特别是对破伤风类毒素过敏者。

