




核准日期: 2011年10月21日

核准日期: 2013年4月8日

2014年6月28日

2015年12月1日

2016年7月18日

2018年1月3日

2019年1月11日

2020年5月8日

2021年9月28日

【药品名称】

通用名称: 注射用重组人干扰素α2b

【成分和性状】

本品为白色冻干粉,加水后呈白色溶液。

辅料:乳糖、氯化钠

规格:1000IU/瓶

【用法用量】

1. 用法:肌肉注射。

2. 用量:每日一次,每次1000IU。

【不良反应】

1. 发热、寒战、头痛、乏力、肌肉酸痛等。

2. 恶心、呕吐、食欲不振、腹泻等。

3. 白细胞减少、血小板减少等。

4. 肝功能异常、转氨酶升高。

5. 过敏反应、皮疹、荨麻疹等。

6. 呼吸困难、咳嗽、痰多等。

7. 视力模糊、复视、眼痛等。

8. 听力下降、耳鸣、耳痛等。

9. 味觉、嗅觉异常。

10. 其他不良反应。

【不良反应】

常见不良反应:

(1) 发热、寒战、头痛、乏力、肌肉酸痛等。

(2) 恶心、呕吐、食欲不振、腹泻等。

(3) 白细胞减少、血小板减少等。

(4) 肝功能异常、转氨酶升高。

(5) 过敏反应、皮疹、荨麻疹等。

(6) 呼吸困难、咳嗽、痰多等。

(7) 视力模糊、复视、眼痛等。

(8) 听力下降、耳鸣、耳痛等。

(9) 味觉、嗅觉异常。

(10) 其他不良反应。